

Nome comune: BALLERINA GIALLA (Inglese: grey wagtail)

Nome scientifico: Motacilla cinerea

Famiglia: Motacillidi (Motacillidae)

Ordine: Passeriformi (Passeriformes)

Classe: Uccelli (Aves)



A cura di Stefania Busatta

animalieanimali 

CARATTERISTICHE:

Abbiamo sicuramente avuto l'occasione di scorgere il profilo elegante di questo uccello nella stagione estiva in prossimità dei torrenti di collina o di montagna (sulle Alpi è stata osservata sino a 2200 metri s.l.m.).

Il maschio presenta una colorazione più ben marcata rispetto alla femmina. In particolare le parti superiori sono grigie, le ali e la coda sono nere con le estremità bianche. Tra il capo grigio e il sottogola nero si interpone una striscia bianca (detta stria malare). Il sopraciglio è di color bianco e contrasta nettamente con le rimanenti parti scure del capo. La femmina oltre a possedere colori meno definiti, si distingue per il sottogola bianco. Il piumaggio del giovane si avvicina a quello della femmina, anche se le tonalità sono leggermente più chiare.

VITA ED ABITUDINI:

La ballerina gialla si nutre di insetti che cattura sul terreno o in volo.

Questo piccolo uccello trascorre l'inverno sulle rive dei fiumi in zone umide, anche urbane. Anche se sostanzialmente è una specie solitaria, si possono formare dei piccoli stormi nelle zone con abbondanza di cibo.

Per la riproduzione questo uccellino predilige le sponde dei torrenti in collina e in montagna. Durante questo periodo il nostro amico diventa totalmente solitario e territoriale (ossia difende un'area delimitata). La coppia è monogama ed il nido è costruito da entrambi i genitori, in un foro sui muri o tra le rocce in prossimità di corsi d'acqua. La femmina depone 4-6 uova biancastre con puntini grigi. Annualmente sono effettuate due, talvolta tre, deposizioni. La cova si protrae per 11-14 giorni ed è curata da entrambi i sessi. I pulcini permangono nel nido per circa due settimane e sono alimentati dai genitori.

DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE LA BALLERINA GIALLA:

Questo uccello per la nidificazione occupa quasi tutta l'Europa occidentale sino ai confini con la Russia. La possiamo incontrare anche in Marocco, in Algeria e in Medio Oriente. Oltre gli Urali il suo areale di spinge sino al Giappone e alla Kamciatka. La ballerina gialla è un migratore parziale. Le popolazioni nordeuropee svernano nel bacino del Mediterraneo. Alcuni soggetti si

portano oltre il Sahara, ed in particolar modo si concentrano nelle zone dei grandi laghi. Le popolazioni siberiane svernano in India, Cina, Indocina, Indonesia e Nuova Guinea.

CURIOSITA':

Questo uccellino è facilmente individuabile perché non saltella, ma cammina sul terreno, alzando e abbassando continuamente la lunga coda.