

**Nome comune:** FURETTO (Inglese: domestic ferret)

**Nome scientifico:** Mustela putorius furo

**Famiglia:** Mustelidi (*Mustelidae*)

**Ordine:** Carnivori (*Carnivora*)

**Classe:** Mammiferi (*Mammalia*)



animali@animali

**A cura di Stefania Busatta**

## CARATTERISTICHE

Il furetto possiede un corpo agile e snello. Sfoggia una pelliccia che varia dal beige al nero al bianco, anche se la maggior parte è color zibellino.

Come nella maggior parte dei Carnivori, i sensi sono molto sviluppati.

Tra il maschio e la femmina non sussiste un'accentuata differenza, ad eccezione delle dimensioni maggiori del maschio (quindi non si ha un evidente dimorfismo sessuale).

Il furetto non è in grado di vivere a lungo in natura, ma in cattività può raggiungere i 10 anni.

A circa un anno il furetto è adulto. Il peso varia da 0.4 a 1.2 kg (il maschio può pesare sino a 2.7 kg) ed è lungo 30-40 cm. La coda varia dai 7 ai 10 cm.

## VITA ED ABITUDINI

Il furetto è un animale addomesticato, originato dalla puzzola. Esso è attivo soprattutto all'alba e al crepuscolo e trascorre molte ore a sonnecchiare (sino a 20 ore al giorno). Quando non dorme interagisce molto con gli altri animali domestici (cani, gatti ed altri furetti).

Il furetto è estremamente agile ed è in grado di compiere svariati movimenti. Inoltre dà vita spesso a delle vere e proprie lotte con altri simili.

Il furetto ha un metabolismo molto elevato e, quindi, necessita di mangiare molto frequentemente (circa 10 volte al giorno). Nonostante sia addomesticato sin dall'antichità, di tanto in tanto lascia trasparire la sua indole di abile predatore e, infatti, si sono registrati molti casi di uccisione di piccoli uccelli. Le predazione nel furetto è influenzata dall'esperienza olfattiva avvenuta nei primi mesi di vita: nell'adulto, infatti, la ricerca della preda è stimolata dagli odori familiari e non da quelli sconosciuti.

La stagione riproduttiva cade tra marzo ed agosto. All'avvicinarsi di tale periodo, il maschio produce una gran quantità di sostanze oleose che determinano lo scolorimento della pelliccia, che diventa giallastra. Durante l'accoppiamento, il maschio morde il collo della femmina. La femmina, dopo una gestazione di circa 40 giorni, partorisce dei piccoli che pesano appena 6-12 grammi ed hanno gli occhi chiusi. Per circa 2 mesi la madre assicura attenzioni particolari ai nascituri.

## **DOVE E' POSSIBILE INCONTRARE IL FURETTO**

Il furetto, anche se originariamente prediligeva le foreste, oggi è presente in tutto il mondo.

## **CURIOSITA'**

Come già detto, il furetto deriva da un processo di addomesticamento della puzzola (*M. putorius*) effettuato dall'uomo circa 2000 anni fa. Oggi funge soprattutto da animale da compagnia, ma è stato utilizzato in diversi ambiti, ad esempio per stanare i conigli selvatici oppure per limitare la presenza dei roditori nelle navi.